

EDITAL Nº 005/2015
Divulgação do Resultado da Análise dos Recursos – Prova Objetiva

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), por meio da sua Coordenação de Ensino (COENS), e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística em conformidade com o item 11.1.1 do Edital de Abertura a **Divulgação do Resultado da Análise dos Recursos – Prova Objetiva**, após a divulgação do gabarito preliminar.

1. Fica **DIVULGADO** o julgamento do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, conforme a seguir:

Programa: ANESTESIOLOGIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0005	CAMILA MORAES DE SOUZA CAMACHO PEREIRA
0084	FABIANA GOMES PIERONI
0712	FERNANDA MARTINS LOUREIRO
0612	FLAVIA GRIVET MENDES DE MORAES
0769	GABRIEL DE ALMEIDA MACHADO
0774	GABRIEL MOLINARO DE SOUZA ESPERON
0116	GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BRUNO
0746	HELEN COSTA PEREIRA
0315	IGOR SODRÉ JAPPONI BACELLAR
0488	JANSEN XAVIER FERNANDES
0110	JAQUELINE MOTA DA SILVA
0069	JULIANA CORDEIRO VASCONCELLOS
0772	JULIANA MARTINS MOTA
0010	KAROLINE GUEDES MESQUITA SALVIANO
0149	LAYLA MELIZE SANTOS MENEZES
0006	LIVIA CAMARA ALVES
0357	LUCAS ARCHANJO DOS SANTOS
0748	MARIA HELENA CARDOZO CASADO
0051	MATHEUS DENECKE PADILHA
0376	MICHELLE CLARA DO REGO BONIFACIO
0744	RAFAEL VASCONCELLOS DE MATTOS
0802	ROBERTA RODRIGUES DE CARVALHO
0059	TAIS MARINHO BULCAO

QUESTÃO Nº 01 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A resposta para a questão encontra-se fundamentada no livro SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1075 onde consta a definição de Pseudomixoma Peritoneal, justificando a resposta dada à questão.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 12 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão conceitua a anemia falciforme e cita a crise do sequestro esplênico como uma de suas principais complicações. Em seguida discursa sobre a crise do sequestro esplênico e solicita à alternativa que inclui a idade mais acometida por esta complicação. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo “*Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014*” - A crise do sequestro esplênico é a mais grave das crises anêmicas e ocorre por um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides esplênicos.” “Ocorre geralmente em crianças pequenas (entre 6 meses e 1 ano de idade), muitas vezes como a primeira manifestação clínica da anemia falciforme.” “Os pacientes que não sofreram fibrose esplênica é que estão sob risco, como os portadores de anemia falciforme até 1 ano de idade, e os portadores de doença SC ou Sβ+ talassemia.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: A

QUESTÃO Nº 18 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014:* “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A **Esclerose Múltipla** (neuropatia desmielinizante autoimune) e a **Esclerose Lateral Amiotrófica** ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.” Sendo assim a resposta Correta poderia ser a alternativa A **Esclerose Múltipla** e a alternativa B – **Esclerose Lateral Amiotrófica**). Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 24 – GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 25 – GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. Por ter ocorrido à duplicidade da **questão 25 e 26** decidimos pela anulação desta questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 33 – MEDICINA PREVENTIVA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Os indicadores destinados à análise da situação de saúde se referem ao estado de saúde da população e aos fatores que a determinam. A relação completa dos indicadores selecionados para o IDB consta da **Matriz de Indicadores**, que dispõe a sua denominação, conceituação, método de cálculo, categorias de análise e fontes de dados. A resposta para a questão encontra-se fundamentada na *Matriz de Indicadores Básicos* publicado pelo Ministério da Saúde - <http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/matriz.pdf>.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 34 – MEDICINA PREVENTIVA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A resposta para a questão encontra-se fundamentada Guia de Vigilância Epidemiológica (caderno 1) publicado pelo Ministério da Saúde, que traz todas as informações sobre o Vírus “Influenza”. (bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicações/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf).

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 37 – MEDICINA PREVENTIVA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- ▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. O próprio trecho da legislação citado pelo requerente demonstra a finalidade de atenção às populações carentes pelo PIASS. É uma questão de interpretação crítica. Regiões como o Vale do Jequitinhonha e áreas afetadas pela seca são citadas no texto da lei e são sabidamente regiões das mais pobres e carentes do país. Claro que o PIASS não pode se resumir simplesmente a essa assistência aos carentes; entretanto a afirmativa contida na letra A não diz em momento nenhum que esse seja o único ou maior objetivo e sim UM objetivo do programa.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 42 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- ▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursiva sobre o acompanhamento das mudanças sexuais na infância através dos denominados “Estágios de Tanner” e solicita a alternativa que inclui a classificação do “Estágio de Tanner” para uma menina que apresente crescimento e projeção da aréola e da papila formando uma elevação acima do corpo da mama, além de pelos pubianos em sínfise púbica e grandes lábios, escuros e encaracolados. De acordo com a bibliografia orientada para este concurso *BERHMAN, E. R; KLIEGMAN, R. M; JENSON, H.B. Textbook of Pediatrics. 19ª edição, Philadelphia: Saunders, 2013 e LOPEZ, R. A., JÚNIOR, D. C. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3ª edição, Manole: 2014: “O primeiro sinal da puberdade nas meninas é o aparecimento do broto mamário – telarca (Estágio M2 de Tanner). Geralmente ocorre entre oito e 12 anos e é dependente principalmente da secreção de estrógenos. Em seguida ocorre a pilificação pubiana – pubarca, que é dependente dos andrógenos adrenais.” “O Estágio de desenvolvimento puberal feminino denominado M4 ocorre entre 10 anos e meio a 15 anos de idade e se caracteriza pelo crescimento e projeção da aréola e da papila formando uma elevação acima do corpo da mama.” “O Estágio de desenvolvimento puberal feminino denominado P3 ocorre entre 9 anos e meio a 14 anos de idade e se caracteriza pela presença de pelos mais escuros, mais espessos e mais encaracolados, distribuindo-se na sínfise púbica.” “O Estágio de desenvolvimento puberal feminino denominado P4 ocorre entre 10 anos e meio a 15 anos de idade e caracteriza-se pela presença de pelos do tipo adulto, porém não atingindo a superfície interna das coxas.”*

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 43 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- ▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez que

A questão define atraso puberal, cita como suas causas o hipogonadismo hipogonadotrófico e solicita a alternativa que inclui a causa mais frequente de hipogonadismo no sexo feminino caracterizada pelo cariótipo 45 X0. De acordo com a bibliografia orientada para este concurso *BERHMAN, E. R; KLIEGMAN, R. M; JENSON, H.B. Textbook of Pediatrics. 19ª edição, Philadelphia: Saunders, 2013:* “A **Síndrome de Turner** é a causa mais frequente de hipogonadismo no sexo feminino. Estima-se que ocorra em 1,5% das concepções, 10% dos abortos espontâneos e 1:2500 dos nascidos vivos.” “Caracteriza-se pelo cariótipo 45X0 e mosaicos 45X0;46XX.” “A **síndrome de Klinefelter** é a causa mais frequente de hipogonadismo no sexo masculino, afetando 1 entre cada 500-1000 homens. O cariótipo mais comum é o 46XXY, mas pode ocorrer 48 XXXY e mosaicos 46XY; 47XXY.” “A **Síndrome de Noonan** é uma síndrome com aspectos fenotípicos semelhantes à síndrome de Turner, mas causada por uma mutação no braço longo do cromossoma 12. O cariótipo pode ser XX ou XY.” “A Deficiência congênita de GnRH é uma forma de deficiência isolada de gonadotrofinas que resulta de uma incapacidade de produção de GnRH pelos neurônios hipotalâmicos ou de uma mutação no receptor de GnRH hipofisário. Na infância, quando associada à anosmia, fenda lábio-palatina e sindactilia é referida como a **Síndrome de Kallmann**.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 46 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. Uma vez que ocorreu um erro na formulação da questão, não havendo nenhuma alternativa que corresponde ao comando dado no enunciado da questão optamos pela anulação da referida questão. Segundo o Ministério da Saúde a frequência e distribuição das malformações congênitas em presumidos vivos no Brasil mais comuns são: Malformação - sistema osteomuscular (8.193) e em segundo lugar Malformação do sistema nervoso.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 50 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o PROTOCOLO CLÍNICO E ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA, a resposta divulgada pelo gabarito está correta, mas apresenta variações das informações entre autores, portanto optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

Programa: CANCEROLOGIA CIRÚRGICA	
Nº de Inscrição	Candidato
0143	AMANDA HANAY MATSUMOTO

Programa: CANCEROLOGIA CIRÚRGICA	
Nº de Inscrição	Candidato
0543	ISADORA TELES SANJUAN
0167	THIAGO ARAUJO GONCALVES

QUESTÃO Nº 15 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. Em face da ocorrência de um erro de digitação na “**CARCINOIDE**” o que impossibilitou a resolução de forma correta por parte dos candidatos.

Portanto, decidimos pela anulação a referida questão.

QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO Nº 38 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Se tratando de insuficiência aguda, existem indicações relativas para a nutrição parenteral total. Quando crônica, não há fundamentos que justifiquem indicação. Segundo o SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 171.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 43 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. O conceito de membrana esofágica congênita não se aplica ao relatado pela candidata, segundo o livro SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1016.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 44 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. As infecções do local da ferida são as complicações mais comuns vistas após **apendicectomia**. Segundo o SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1262

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

Programa: CANCEROLOGIA CLÍNICA	
Nº de Inscrição	Candidato
0107	CARLA PIRES AMARO
0730	DANIELLE BRANDES ZAKON
0403	HENRIQUE MUGLIA THOMAZ DA SILVA
0197	SILAS

QUESTÃO Nº 02 – CLÍNICA MÉDICA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão conceitua a anemia falciforme e cita a crise do sequestro esplênico como uma de suas principais complicações. Em seguida discursa sobre a crise do sequestro esplênico e solicita à alternativa que inclui a idade mais acometida por esta complicação. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo “*Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014*” - A crise do sequestro esplênico é a mais grave das crises anêmicas e ocorre por um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides esplênicos.” “Ocorre geralmente em crianças pequenas (entre 6 meses e 1 ano de idade), muitas vezes como a primeira manifestação clínica da anemia falciforme.” “Os pacientes que não sofreram fibrose esplênica é que estão sob risco, como os portadores de anemia falciforme até 1 ano de idade, e os portadores de doença SC ou S β + talassemia.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: A

QUESTÃO Nº 10 – CLÍNICA MÉDICA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão define o conceito de tireotoxicose e solicita a alternativa que contém uma MANIFESTAÇÃO desta patologia. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo - *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e L. Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014.*: “São Sinais e sintomas da Síndrome de Tireotoxicose: pele quente e lisa, sudorese excessiva, prurido, cabelo fino e sedoso, eritema palmar, queda de cabelos, separação da unha do respectivo leito ungueal; oligomenorreia e amenorreia, perda da libido e disfunção erétil; **hipercalcemia**/calciúria, hipoproteinemia, elevação de ALT, fosfatase alcalina, enzima conversora de angiotensina e ferritina, redução do colesterol e microcitose.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 13 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão cita a deficiência de ferro como a principal causa de anemia em todo o mundo e solicita alternativa que contém a principal causa de anemia por deficiência de ferro. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “A deficiência de ferro é a principal causa de anemia em todo o mundo.” “A principal causa de anemia por deficiência de ferro é o sangramento crônico.” “Para crianças e adolescentes a principal causa é o sangramento gastrointestinal por infestação parasitária”. “Para mulheres pré-menopausa a principal causa de anemia é a hipermenorréia.” “Para homens e mulheres pós-menopausa a principal causa de anemia é o sangramento gastrointestinal.”.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 22 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A **Esclerose Múltipla** (neuropatia desmielinizante autoimune) e a **Esclerose Lateral Amiotrófica** ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.” Sendo assim a resposta Correta poderia ser a alternativa A **Esclerose Múltipla** e a alternativa B – **Esclerose Lateral Amiotrófica**). Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 23 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre o câncer de esôfago e solicita a alternativa que inclui uma característica correta sobre esta patologia. De acordo com o *Edital deste Concurso* foram assuntos orientados para estudo: “Interpretação de sinais e sintomas; diagnóstico sindrômico. Indicação e interpretação de exames complementares básicos.” “Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias.” “**Aparelho Digestivo**, parasitoses intestinais, câncer gástrico.” “Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome

disabsortiva. Colelitíase e coledocolitíase. Doenças inflamatórias do intestino. Câncer dos Cólon. Pancreatites.”.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 26 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre a classificação do câncer colorretal de acordo com o Estadiamento TNM do Câncer Colorretal e solicita a alternativa correta que inclui a classificação de um tumor colorretal invadindo a camada muscular própria, com metástase para 2 linfonodos regionais pericólicos e com sinais de metástase óssea. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal – T2 caracteriza um tumor que cresce através da submucosa e estende-se até a muscular própria e T3 caracteriza um tumor que invade a muscular própria e estende-se à subserosa e gordura pericólica ou perirretal.” “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal N1 caracteriza um tumor que invade 1 a 3 linfonodos regionais e N2 caracteriza um tumor que invade 4 ou mais linfonodos regionais.” “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal M0 indica nenhum indício de metástase à distância e M1 indica metástase à distância, com M1a caracterizando metástase para linfonodos não regionais, M1b metástase para osso e M1c metástase para outros sítios.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 45 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez que segundo o Artigo SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR: INSPEÇÃO, PALPAÇÃO E PERCUSSÃO, disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/4semiologia_cardiovascular.pdf, cita que:

- PULSO BISFERIENS: Pulso amplo, com dois componentes perceptíveis durante a sístole. Sinonímia - Pulso de Corrigan; Pulso em martelo d'água. - Geralmente, acompanhado de outros sinais periféricos de Insuficiência Aórtica.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

Programa: CIRURGIA PLÁSTICA	
Nº de Inscrição	Candidato
0437	CESAR AUGUSTO SILVA FERNANDES
0652	EUDEMARA FERNANDES DE HOLANDA
0454	FLAVIA VIDAL CABERO
0533	ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
0697	VANESSA LEO PEDROZO RAJO

QUESTÃO Nº 06 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A alternativa B não se encontra incorreta segundo a definição de infecção do sítio cirúrgico no SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 282.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 11 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A classificação de Bismuth demonstrada no enunciado refere ao Tipo I, segundo o SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1485.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 23 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. As indicações de toracotomia de emergência estão referenciadas no SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 464.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 38 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Se tratando de insuficiência aguda, existem indicações relativas para a nutrição parenteral total. Quando crônica,

não há fundamentos que justifiquem indicação. Segundo o SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. 18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 171.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "A"

QUESTÃO Nº 49 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. O erro de digitação presente na alternativa "C", onde conta "ética" quando o correto seria "étnica" pode ter causado problemas quanto à resolução correta da questão, uma vez que o enunciado solicitava a alternativa incorreta.

Portanto, decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

Programa: ENDOSCOPIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0290	JESSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO FILHO
0726	JULIANA DELGADO CAMPOS

QUESTÃO Nº 18 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre a classificação do câncer colorretal de acordo com o Estadiamento TNM do Câncer Colorretal e solicita a alternativa correta que inclui a classificação de um tumor colorretal invadindo a camada muscular própria, com metástase para 2 linfonodos regionais pericólicos e com sinais de metástase óssea. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: "No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal – T2 caracteriza um tumor que cresce através da submucosa e estende-se até a muscular própria e T3 caracteriza um tumor que invade a muscular própria e estende-se à subserosa e gordura pericólica ou perirretal." "No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal N1 caracteriza um tumor que invade 1 a 3 linfonodos regionais e N2 caracteriza um tumor que invade 4 ou mais linfonodos regionais." "No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal M0 indica nenhum indício de metástase à distância e M1 indica metástase à distância, com M1a caracterizando metástase para linfonodos não regionais, M1b metástase para osso e M1c metástase para outros sítios."

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "C"

QUESTÃO Nº 29 – CIRURGIA GERAL

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. O apêndice é o órgão mais acometido do trato gastrointestinal, segundo o SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. 18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1234.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

Programa: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0198	FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA
0560	INGRID LUISE SOARES PINTO
0027	JULIANO DE ALBUQUERQUE REIS E SILVA
0002	LETICIA GONTIJO PORTO
0322	NATALIA LASO FONSECA
0284	SARAH GALVAO PEREIRA

QUESTÃO Nº 02 – CLÍNICA MÉDICA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão conceitua a anemia falciforme e cita a crise do sequestro esplênico como uma de suas principais complicações. Em seguida discursa sobre a crise do sequestro esplênico e solicita a alternativa que inclui a idade mais acometida por esta complicação. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014; “A crise do sequestro esplênico é a mais grave das crises anêmicas e ocorre por um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides esplênicos.” “Ocorre geralmente em crianças pequenas (entre 6 meses e 1 ano de idade), muitas vezes como a primeira manifestação clínica da anemia falciforme.” “Os pacientes que não sofreram fibrose esplênica é que estão sob risco, como os portadores de anemia falciforme até 1 ano de idade, e os portadores de doença SC ou Sβ+ talassemia.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 10 – CLÍNICA MÉDICA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão define o conceito de tireotoxicose e solicita à alternativa que contém uma MANIFESTAÇÃO desta patologia. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - Harrison -

Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e L. Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014.: “São Sinais e sintomas da Síndrome de Tireotoxicose: pele quente e lisa, sudorese excessiva, prurido, cabelo fino e sedoso, eritema palmar, queda de cabelos, separação da unha do respectivo leito ungueal; oligomenorreia e amenorreia, perda da libido e disfunção erétil; **hipercalcemia**/calciúria, hipoproteinemia, elevação de ALT, fosfatase alcalina, enzima conversora de angiotensina e ferritina, redução do colesterol e microcitose.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "D"

QUESTÃO Nº 12 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre a Síndrome de Cushing e solicita a alternativa que contém a manifestação clínica mais prevalente associada a esta síndrome. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo - Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014; e W Rabow Current – Medical Diagnosis and Treatment. Editora McGraw-Hill, 53ª Edição, 2013: “A causa mais comum da Síndrome de Cushing é a iatrogênica, pela administração de glicocorticoides nas mais diversas situações clínicas (síndrome de cushing exógeno)”. “Os achados mais característicos são a distribuição anormal de gordura na fossa supraclavicular e temporal, fraqueza muscular proximal, estrias violáceas largas (>1cm), aparecimento de irritabilidade, redução da cognição e da memória de curto prazo.” “As manifestações clínicas mais prevalentes são a obesidade centrípeta (97%), o aumento de peso (94%), fadiga e fraqueza (87%), hipertensão (82%) e hirsutismo (80%).”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "D"

QUESTÃO Nº 13 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão cita a deficiência de ferro como a principal causa de anemia em todo o mundo e solicita alternativa que contém a principal causa de anemia por deficiência de ferro. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “A deficiência de ferro é a principal causa de anemia em todo o mundo.” “A principal causa de anemia por deficiência de ferro é o sangramento crônico.” “Para crianças e adolescentes a principal causa é o sangramento gastrointestinal por infestação parasitária”. “Para mulheres pré-menopausa a principal causa de anemia é a hipermenorréia.” “Para homens e mulheres pós-menopausa a principal causa de anemia é o sangramento gastrointestinal.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "B"

QUESTÃO Nº 22 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

- ▶ O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A Esclerose Múltipla (neuropatia desmielinizante autoimune) e a Esclerose Lateral Amiotrófica ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.”. Sendo assim, a resposta Correta poderia ser a alternativa “A” **Esclerose Múltipla** e a alternativa “B” **Esclerose Lateral Amiotrófica**.*

Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 26 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- ▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre a classificação do câncer colorretal de acordo com o Estadiamento TNM do Câncer Colorretal e solicita a alternativa correta que inclui a classificação de um tumor colorretal invadindo a camada muscular própria, com metástase para 2 linfonodos regionais pericólicos e com sinais de metástase óssea. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este Concurso - *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal – T2 caracteriza um tumor que cresce através da submucosa e estende-se até a muscular própria e T3 caracteriza um tumor que invade a muscular própria e estende-se à subserosa e gordura pericólica ou perirretal.” “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal N1 caracteriza um tumor que invade 1 a 3 linfonodos regionais e N2 caracteriza um tumor que invade 4 ou mais linfonodos regionais.” “No Estadiamento TNM do Câncer Colorretal M0 indica nenhum indício de metástase à distância e M1 indica metástase à distância, com M1a caracterizando metástase para linfonodos não regionais, M1b metástase para osso e M1c metástase para outros sítios.”.*

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 29 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- ▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão discursa sobre a Doença de Alzheimer e solicita a alternativa que contém a manifestação clínica mais comum do seu quadro inicial. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo - *Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014; e*

*W Rabow Current – Medical Diagnosis and Treatment. Editora McGraw-Hill, 53ª Edição, 2013: “A Doença de Alzheimer é considerada a principal causa de síndrome demencial, sendo associada a mais de 50% dos casos.” “É uma síndrome de evolução insidiosa, que começa com perda de memória anterógrada e **desorientação temporoespacial**.” “Segue de modo progressivo com distúrbio do raciocínio lógico, planejamento, linguagem, agnosias, apraxias e desinteresse pelas atividades habituais.”*

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 43 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. “Alguns estudos têm mostrado uma associação entre essas duas entidades, embora os dados sejam ainda controversos. O peso elevado tanto ao nascer quanto mais tarde na infância aumenta a incidência e prevalência de asma. Há evidências indicando uma maior dificuldade de se obter o controle adequado da asma em pacientes obesos. Essa dificuldade pode ser devida a um diferente fenótipo inflamatório (não eosinofílico), à presença de comorbidades (refluxo gastroesofágico e apneia obstrutiva do sono), ou a fatores mecânicos. O manejo da asma não difere daquele em pacientes sem obesidade. Entretanto, estudos têm demonstrado que a redução do peso melhora a função pulmonar, a morbidade e a qualidade de vida.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 44 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez que a diminuição do diâmetro látero-lateral do tórax inferior é o achado semiológico denominado Sinal de Hoover, presente na respiração paradoxal como diz o enunciado da questão, sendo que respiração paradoxal defini-se por expansão do gradeado costal, por causa da ação dos músculos inspiratórios, ocorre concomitantemente com a expansão do abdome, conseqüente à descida do diafragma. Os movimentos não sincronizados do gradeado costal e do abdome são chamados de respiração paradoxal e, frequentemente, indicam fadiga dos músculos respiratórios, podendo anunciar insuficiência respiratória iminente.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 45 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez que segundo o Artigo SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR: INSPEÇÃO, PALPAÇÃO E PERCUSSÃO, disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/4semiologia_cardiovascular.pdf, cita que:

- PULSO BISFERIENS: Pulso amplo, com dois componentes perceptíveis durante a sístole. Sinonímia - Pulso de Corrigan; Pulso em martelo d'água. - Geralmente, acompanhado de outros sinais periféricos de Insuficiência Aórtica.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "A"

QUESTÃO Nº 46 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez que valores aumentados de Colinesterase sugerem Alcoolismo, câncer de mama, síndrome nefrótica, obesidade, hiperlipoproteinemia do tipo IV e psicose. *Referência: ROSALKI, S. B. Low Serum Creatine Kinase Activity. Clin. Chem., 4:905. 1998.; SZASZ, G., GRUPER, W., BERNT, E. Creatine kinase in serum. I. Determination of optimum reaction conditions.; WU, A. H. B. Creatine kinase isoforms in ischemic heart disease. Clin. Chem., 35:7-13, 1989.*

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "B"

Programa: MASTOLOGIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0773	BIANCA KURTZ FONTOURA
0771	ERICA MOTRONI DE ALMEIDA
0750	JULIANA PEGAS CAVALCANTI
0751	MARCELA EMBIRUÇU CARVALHO
0701	PAULO MAURICIO SOARES PEREIRA FILHO
0701	PAULO MAURICIO SOARES PEREIRA FILHO

QUESTÃO Nº 04 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "C"

QUESTÃO Nº 07 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Quanto aos resultados sobre exames de citologia: A sensibilidade do exame é alta (96,0%), no entanto sua especificidade é baixa (51,5%), significando a inclusão de muitos resultados falsos positivos, sendo suficiente para concluir que esse teste, na verdade, serve somente como guia para a realização da biópsia. Portanto existe a necessidade da biópsia para direcionar a conduta no caso da paciente.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "D"

QUESTÃO Nº 08 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. Após análise da questão constatou-se erro em sua elaboração o termo adequado a ser usado seria: antibioticoprofilaxia, termo esse usado em vários protocolos de bolsa rota pré termo (menor que 37 semanas) , o termo antibioticoterapia seria indicado quando na presença de processo infeccioso já estabelecido e não no risco de transmissão como é feito para bolsa rota. Portanto fica anulada a questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 10 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. Após análise constatou-se erro na divulgação do gabarito pelos dados apresentados o quadro a que o enunciado da questão se refere a **cisto hemorrágico em resolução**.

Portanto fica, **RETIFICADO** de **"D"** para **"B"** a resposta correta para a referida questão.

Alternativa correta: "B"

QUESTÃO Nº 25 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**, uma vez no sentido de diminuir a formação de líquido amniótico pode-se empregar a indometacina, cuja função é diminuir a função renal fetal. Recomenda-se dosagem de 25 mg VO a cada 6 horas, por até 3 dias, não

devendo ultrapassar a 34ª semana. Tais cuidados são necessários para evitar uma das complicações temidas do uso da indometacina na gestação, que é o fechamento precoce do duto arterioso.

Referência: Ministério da Saúde em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.htm

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 47 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A requerente se equivocou na sua afirmação, pois tanto a lesão do nervo laríngeo-recorrente, o sangramento e a hipocalcemia são complicações da tireoidectomia total, EXCETO a **hipercalcemia**.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “C”

Programa: MEDICINA NUCLEAR	
Nº de Inscrição	Candidato
0036	BEATRIZ ARRUDA MATHEOS DE LIMA
0244	LUIS GUILLERMO RONCALLO KELSEY
0562	REBECCA STABENOW
0094	VALDIR ANTONIO GARCIA JUNIOR

QUESTÃO Nº 18 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 201;* e *Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014:* “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A **Esclerose Múltipla** (neuropatia desmielinizante autoimune) e a **Esclerose Lateral Amiotrófica** ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.”. Sendo assim, a resposta Correta poderia ser a alternativa “A” **Esclerose Múltipla** e a alternativa “B” **Esclerose Lateral Amiotrófica**.

Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 24 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: "A"

QUESTÃO Nº 46 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o Ministério da Saúde, a frequência e distribuição das malformações congênitas em presumidos vivo no Brasil mais comuns são: Malformação - sistema osteomuscular (8.193) e em segundo lugar Malformação do sistema nervoso. Por não apresentar nenhuma alternativa que corresponde ao comando dado no enunciado da questão optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 50 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o "protocolo clínico e assistencial de atenção à saúde da criança", a resposta divulgada pelo gabarito estaria correta, mas por haver contradições das informações entre autores, optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

Programa: PATOLOGIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0370	SARA FONSECA LUCAS

QUESTÃO Nº 24 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 50 – PEDIATRIA

► **Resultado da Análise: DEFERIDO**

► **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o “*protocolo clínico e assistencial de atenção à saúde da criança*”, a resposta divulgada pelo gabarito estaria correta, mas por haver contradições das informações entre autores, optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

Programa: RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	
Nº de Inscrição	Candidato
0675	ALEHANDRO NEVES TERRA
0731	BARBARA FERRAÇO DALMASO
0164	DIOGO COSTA LEANDRO DE OLIVEIRA
0188	EDUARDO OLIVEIRA PACHECO
0457	EUGENIO CEZAR ROCHA SANTOS FILHO
0160	FERNANDA BOLDRINI ASSUNÇÃO
0724	FERNANDO GILDER GUTIERREZ REVOLLO
0304	GABRIEL NAKAMURA DA SILVA
0497	GABRIEL SOARES MENDONÇA
0700	HENRIQUE VILAS BOAS DE OLIVEIRA ANDRADE
0587	IGOR CARVALHO DE ARAUJO CUNHA
0066	IGOR SCHNEIDER FAÉ
0598	ISADORA FONSECA TEIXEIRA LEMOS CALIXTO
0140	MARILIA MARIA VASCONCELOS GIRAO

Programa: RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	
Nº de Inscrição	Candidato
0462	MARINA BARCELOS DE FIGUEIREDO
0186	SHEYLLA KARINE MEDEIROS
0762	TASSIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
0434	THAIS SALGADO MONNERAT

QUESTÃO Nº 01 – CIRURGIA GERAL

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A resposta para a questão encontra-se fundamentada no livro SABISTON, D.C.JR. et al. -Tratado de cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna.18ª. Edição. Rio de Janeiro. Página 1075 onde consta a definição de Pseudomixoma Peritoneal, justificando a resposta dada à questão.

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 12 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. A questão conceitua a anemia falciforme e cita a crise do sequestro esplênico como uma de suas principais complicações. Em seguida discursa sobre a crise do sequestro esplênico e solicita à alternativa que inclui a idade mais acometida por esta complicação. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo “*Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013, e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014*” - A crise do sequestro esplênico é a mais grave das crises anêmicas e ocorre por um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides esplênicos.” “Ocorre geralmente em crianças pequenas (entre 6 meses e 1 ano de idade), muitas vezes como a primeira manifestação clínica da anemia falciforme.” “Os pacientes que não sofreram fibrose esplênica é que estão sob risco, como os portadores de anemia falciforme até 1 ano de idade, e os portadores de doença SC ou Sβ+ talassemia.”

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: A

QUESTÃO Nº 18 – CLÍNICA MÉDICA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo,*

Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 201; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A **Esclerose Múltipla** (neuropatia desmielinizante autoimune) e a **Esclerose Lateral Amiotrófica** ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.”. Sendo assim, a resposta Correta poderia ser a alternativa “A” **Esclerose Múltipla** e a alternativa “B” **Esclerose Lateral Amiotrófica**).

Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 24 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

▶ **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 46 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o Ministério da Saúde, a frequência e distribuição das malformações congênitas em presumidos vivo no Brasil mais comuns são: Malformação - sistema osteomuscular (8.193) e em segundo lugar Malformação do sistema nervoso. Por não apresentar nenhuma alternativa que corresponde ao comando dado no enunciado da questão optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 50 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o “*protocolo clínico e assistencial de atenção à saúde da criança*”, a resposta divulgada pelo gabarito estaria correta, mas por haver contradições das informações entre autores, optamos pela anulação da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

Programa: RADIOTERAPIA	
Nº de Inscrição	Candidato
0287	ALEXANDRE DA FONSECA COLAO
0590	ANA BEATRIZ ABIDO RIBEIRO
0238	CÍNTIA GUEDES CHAVES
0169	LIS NARA OLIVEIRA DOS SANTOS
0077	POLYANNA FALCÃO LIMA DE ALMEIDA
0352	TAISSA PESSOA BOTTON

QUESTÃO Nº 18 – CLÍNICA MÉDICA

► **Resultado da Análise: DEFERIDO**

- O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**. A questão discursa sobre a Síndrome Piramidal ou Síndrome do 1º neurônio motor e solicita a alternativa que inclui uma de suas causas. De acordo com as bibliografias orientadas neste edital para este processo seletivo *Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2011; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: Elsevier, 2014: “O AVE é a causa comum de síndrome piramidal aguda, assim como o trauma.” “A Esclerose Múltipla (neuropatia desmielinizante autoimune) e a Esclerose Lateral Amiotrófica ou ELA (doença degenerativa do 1º e 2º neurônios motores) causam síndrome piramidal subaguda ou crônica.”. Sendo assim, a resposta Correta poderia ser a alternativa “A” **Esclerose Múltipla** e a alternativa “B” **Esclerose Lateral Amiotrófica**.*

Portanto decidimos pela anulação da questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 24 – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

► **Resultado da Análise: INDEFERIDO**

- **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **improcedente**. Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso com os agentes uterotônicos. Estima-se que o tempo médio para dequitação seria entre 5 -15 minutos e em 97% dos casos até 30 minutos. Descreve-se aumento de incidência de complicações hemorrágicas quando o tempo ultrapassa os 30 minutos. Placenta retida, Extração manual da placenta, quando não se obtém sucesso.

Referências: Zugaib obstetrícia - CHEUNG, W.M. et al. The retained placenta: historical and geographical rate variations. J. Obstet. Gynaecol., v.31, n.1, p.37-42, 2011. - COMBS, C.A.; LAROS JUNIOR, R.K. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet. Gynecol., v.77, n.6, p.863-867, 1991. - ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. National

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 46 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o Ministério da Saúde, a frequência e distribuição das malformações congênitas em presumidos vivo no Brasil mais comuns são: Malformação - sistema osteomuscular (8.193) e em segundo lugar Malformação do sistema nervoso. Por não apresentar nenhuma alternativa que corresponde ao comando dado no enunciado da questão optamos pela anulação da referida questão.
QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 50 – PEDIATRIA

▶ **Resultado da Análise: DEFERIDO**

▶ **Justificativa:** O questionamento apresentado pelo candidato requerente é **procedente**, uma vez que segundo o “*protocolo clínico e assistencial de atenção à saúde da criança*”, a resposta divulgada pelo gabarito estaria correta, mas por haver contradições das informações entre autores, optamos pela anulação da referida questão.
QUESTÃO ANULADA.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2015.

Coordenação de Ensino
Luis Felipe Ribeiro Pinto

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Antônio José Gonçalves de Siqueira